



Рекомендации по применению

Обработка препаратом проводится, как правило, однократно за сезон, при этом применение других стимуляторов роста растений в период вегетации нежелательно. Антистрессовый эффект препарата проявляется независимо от кратности и сроков обработки гербицидами. Допустимо совмещение Стимунола ЕФ в баковых смесях с пестицидами, органоминеральными удобрениями и микроэлементами при некорневых подкормках в период вегетации растений

| Культура | Сроки применения | Норма расхода, мл/т, мл/га |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Озимая пшеница | кущение весной | 20 |
| Яровая пшеница | кущение - начало выхода в трубку | 30 |
| Яровой ячмень | кущение - начало выхода в трубку | 50 |
| Соя | обработка семян | 25 |
| | 2-3 тройчатых листа | 25 |
| Картофель | полные всходы – до цветения | 50 |
| Подсолнечник | 6-8 листьев | 70 |
| Кукуруза | 5-8 листьев | 40 |
| Сахарная свекла | смыкание растений в рядках | 30 |
| Чеснок | 4-5 листьев | 50 |
| Лук-репка | 4-5 листьев | 70 |
| Лук-севок | 2-3 листа | 50 |
| Лен-кудряш | начало ветвления | 50 |
| Земляника садовая | до бутонизации | 100 |
| Хлопок | бутонизация- начало цветения | 110 |